



Ant. Fizes D. M. M. et math. Pr. R.

SPECIMEN

MEDICO-CHIRURGICUM

*In quo precipui Suppurationis eventus
in partibus mollibus expenduntur.*

UT suppuratio laudabilis naturæ opi-
tulatricis molimen est, fluidorum
in ductibus ruptis suppressorum nec vitæ
ampliùs destinatorum expurgationem to-
tis viribus patrantis, cæteris per vasa in-
tegra iter expedientis, solutam partem
ab infarctu subsequuto proindè liberantis,
vascula postremò nonnulla ultrà metas
promoventis, carnea granula ità promen-
tis, eaque in modum caudarum arundi-
num, fabrorum more, implicantis inter
se ac ferruminantis; ità & impotentem
illam interdùm aut debilem in opere
hoc, vel diversimodè procedentem, & à

recto tramite deflectentem , vel prorsus deviam observare contingit , ut in eo nonnunquam hæreat , succumbat , aut debilitetur plurimum ac langueat , aut variâ sub fronte se manifestet , aut vitiosè operetur. Quibus fit , ut sæpè suppurationes optatò non succedant , Medici- que ac Chirurghi solertiam plurimam exigant.

Suppurationum itaque varietates , fata , eventus expendere , deque eorum causis differere constituimus , haud sanè parvi faciendum thema suscepturi ; quò develatis nimirum in suppuratorio opere penitiùs naturæ arcanis , hinc rectâ ratione deinceps ducti , firmumque judicium circa partes suppurantes laturo , ei cum opprimetur , fatiscet , aberrarit , auxilium debitum ferre valeamus.

P R O P O S I T I O I.

Disruptis in parte molli sanguiferis , aliisque intertextis vasculis ; cur interdum suppuratio nullatenus , aut vix ac difficilè excitetur , incepta nonnunquam cohibeatur , aut languidè procedat , expendere.

PLura sunt, ex quibus natura ad sup-
purationis opus quasi impotens fit,
eove incepto fatiscit, sæpèque opprimitur,
præcipua hæc perpendere liber.

1°. Ut excitetur suppuratio, vascula so-
lutæ partis ulteriùs solito fluidis tumef-
cere, tum impensius sana tendi, vehe-
mentiusque vibrari requiritur (illud ipsa-
met indicante naturâ, quæ nullam nisi
inflammatione prægressâ suppurationẽ um-
quàm ciet) quamobrem si hæc satis non
turgeant, liquoresque sat expeditè fluant,
causa suppurationis efficiens, vasculorum
nempè integrorum singeminata pulsio non
excitabitur, aut debilis saltem erit, ma-
teria autem ad suppurationem sufficiens
in ductibus ruptis non aut vix suppetet,
hinc nulla tunc aut levis saltem suppu-
ratio. Hâc de causa plerùmque non sup-
purant Suggillatæ partes, Exanthemata,
Vibices, sic nullatenus aut vix suppurant
Cæsa, quæ liberaliter cruorem profude-
runt, sic impeditur notabiliter in vulne-
ribus suppurationis opus, cum in oris
ac partibus vicinis resolventium medica-
minum applicatione sanguis ad facilem
nimis per vascula fluxum compellitur.

2°. Suppuratorium opus protractas vi-

tales vasorum motiones & adauctas & validas, ut ex inflammatione non modò antecedente illud, sed & aliquali semper concomitante ostenditur, continuò exigit. Cùm autem sanguinei ductus cæteris vehementiùs pulsent, tùm insuper activiori fluido & abundantiori turgeant, quod legitimi puris materies potissima est; patet partes vasculis sanguineis parùm animatas ac velut exangues suppurations segniùs, hinc fit ut ligamenta, tendines, membranæ adiposæ, membranæ tenues ac tensæ, ut periostæa, perichondria, quæque musculos immediatè vestiunt, ac similes haud ità facilè, ut carneæ partes, ad suppurationem vegetam ducantur; uti neque glandulosa corpora lymphatico liquore ubertim, cruore verò parcè irrorata, ut sunt glandulæ, quas Lymphaticas vocant, ut sunt salivales, substantia pancreatis, ac partes similes.

3°. Si copia summâ soluta, disrupta, contrita, laceratave fuerint vascula, pauca, quæ integra remanserint, vitæ parti impertiendæ (sine quâ nullam expectes suppurationem) suffectura non fore deducitur. Quippe quòd pulsiones eorum adeò dispersæ tantæ moli ruptorum duc-

tuum inertium humoribusque torpidis gravatorum sustinendæ impares fiant; ut hinc potius vasa integra opprimi contingat, quàm ea activi quicquam in disrupta liquoresque effoetos moliri possint. Quamobrem nulla aut languida saltem suppuratio, quin frequentius partis in tali casu mortificatio succedet. Eas ob rationes partes contusas ultrà modum attritasque suppurare vix observabis, hæc autem sæpius gangræna corripuntur. Sic & in tormentorum bellicorum vulneribus hæc sæpè metuenda est. Sic & partes ipsæmet corrosæ penitus aut gelu exustæ, igneve torrefactæ non suppurant; vi enim corrosivi aut igniti, aut etiam impensè frigidi corporis in acervum vasculorum ruptorum, undique lacerorum, & confusè cum effusis liquoribus permixtorum immutatæ sunt; hæc autem inconcinna moles extincta penitus viventi inherens arefcit deinceps, & crustosum quid exhibet, hanc *Escharam* (quasi *foeum* diceret) nominarunt Græci. Cùm autem subter *Escharam* vasa partim lacerata, integra partim existant, subjectaque pars vitâ potiatur, hæc est, quæ in tali casu, suppurare solet.

4°. Jam verò quamquàm in solutâ parte distrupta vascula exuperanti non adsint copiâ (quod & in reliquis perpendendis casibus supponemus) si tamen seu abundantibus fluidis , seu rarefactis plurimùm ultrâ modum turgeant , quæ integra remanserunt , ea obruenda fore consequetur , nec enim tunicæ eorum adeò dilatatæ restitui poterunt , hinc cessatio alternati earum motûs , cursus liquorum interruptus , vasorum tandem laceratio intima ac repentina , cum ustionis sensu exin orto , principii vitalis suffocatio , tunc ergò non suppuratio , quin potiùs mortificatio superveniet. Ità cum inflammata sunt prætermodùm vulnera , ità cùm partes plurimùm incensæ sunt , ut in erysipelate summo , in carbunculis quibusdam , acceditque acer in his casibus ustionis sensus , lacerationis intimæ signum , non expectanda tunc suppuratio , rimenda potiùs gangræna. Sic topica calidiora , ut vesicantia , acria , spirituosâ , ac similia suppuraturas partes , orasve vulnerum ultrâ modum nonnunquàm incendiendo suppurationem in eis præpediunt , aut , cùm inceperit , cohibent , succedentique postmodùm mortificationi haud ra-

rō occasionem præbent.

5°. Vix vibrantur inanita vascula, defidia sunt, liquores ruptis vix suppeditant, hinc imbecilla causa, parca materies suppurationis, sic ex hæmorrhagia largâ vasis inanitis, vulnus aut nullatenus aut saltem tardè ac languidè deinceps suppurat; sic dùm fauciatas debiles sunt vires, cùm frequentes superveniunt lypothimiæ, uno verbo quoties sanguinem faucis parti cor languidè subministrat, toties segnis aut nulla fit suppuratio, quin sistitur sæpè, quæ inceperit, ulcusque arefcit, pallefcit pars aut livida fit, interdùm sideratur. Ea de causa in casibus morborum malignorum, venenatorum, pestilentis imprimis eventum hujusmodi observare contingit, cùm frequenter parotides, carbunculi, bubones, pustulæ ad suppurationem debitam adduci arte nullâ possunt, gangrænam autem ac sphacelum invitis auxiliis miserè concipiunt.

6°. Flaccida vascula, resoluta, aut molliora, cùm ingurgitata fuerint, succumbunt facilè, nec enim ad pellenda fluida utut parùm exuperanter suscepta vîpollent sufficienti, languet ergò tunc vî-

tale principium in solutâ parte , unde vel mortificatio aut effœta suppuratio. Itâ se res habet quandòque in teneris quibusdam constitutionibus , frequentius autem in hydropicis , scorbuticis , istiusvè modi cachecticis. Hinc partem œdemate affectam secare , multò magis contundere periculosum est , quippè quòd imminet inde gangræna , aut saltem *ulcus sanatu difficile* , ut monet Hippocrates Aph. 8. sect. 6. purulentâ sorde nimirum expurgare debitè se impotens supervenire soleat. Hinc & quoque difficiles in partibus paralyticis ac languidæ suppurationes , hinc summum iis fauciatis , attritis præcipuè gangrænx periculum.

7°. Vascula integra , si plurimùm exsiccata fuerint , eâ donabuntur rigiditate , quâ irruentibus fluidis obsequiosa non erunt ; quare vix micabunt , nec ad materiem in vasculis ruptis comprimendam , succutiendam , subigendam , & in purulentum liquamen vertendam sufficient , undè impedita suppuratio , parùmque vegeta. Hâc de causa partes labore quotidiano attritæ ægrè suppurant ; pariter in senibus suppurationes floridæ non sunt , itâ prægresso topicorum calefacientium

usu nimio præpeditur interdùm , aut difficilius succedit deinceps suppuratio. Sed & in partibus his exsiccatis & induratis liquores sero ac rore mucilaginoso tenui ita destituti sunt , ut purulento liquamini fluxili efformando materia sufficiens haud suppetat.

8°. Vascula integra solutæ partis ex intimâ vi nimium tensa liquoribus accidentibus dilatari se vix patiuntur, undè citatæ quidem & correptæ non verò amplæ eorum pulsiones , hinc materiei in vasculis ruptis subigendæ compressio debilis , debilis succussio ; prætereà ob tunicarum contentionem angustatâ vasorum capacitate liquores quantitate parvâ transmeant , nec nisi exigua fluidorum suppurandorum moles ruptis vasis sufficitur. In memorato igitur vasorum solutæ partis statu suppuratio succedet parca , multùmque impedietur. Hisce de causis fauciatæ partes dolentes acriter & quasi spasmus in textu intimo correptæ , pure ubere non manant , orasque siccas frequenter exhibent. Casus hic obtingit sæpè fauciatæ partibus plurimum nerveis , sensuque præditis exquisito , item cùm perseverat diutiùs in partibus solutis causti-

carum acriumve particularum admotorum medicaminum energia, ut & cùm massa sanguinea inest nimis acris partibusque serosis ac subviscidis destituta, quæ insuper liquamen mucagineum ad efformandum pus vix suppeditare potest: quas etiam ob causas vulnera erysipelate superficialiario ferventia, halitusque acres exhalantia, ad suppurationem vix perducì possunt, siccaque obstinatè nimis remanent; quin etiam ex adauctâ ulterius tensione vasculorum intestinâ, tanta eorum subsequitur laceratio, ut gangræna suscitetur, prout in carbunculis erysipelate deudente comitatis observare est.

9°. Si validius compressa fuerint vascula solutæ partis, inhibebitur liquorum versùs cor reditus, hæc ergò infarciuntur ultrà modum; vel si arctius adhuc inducta fuerit compressio, ea liquores sufficienter non suscipient, iique progredientur lento gradu; in utroque igitur casu languebunt vasorum pulsiones, liquores lentescunt, undè vel nullatenùs vel languidè admodum procedet suppuratio, quin & periculum, ne extinguatur pars, proximum aderit; id autem in casu priori declarabitur calore intenso partem

urente, in posteriori frigore mortifero partem occupante (Confer art. 4. & 5.) Hujusmodi planè negotium succedere solet, cum sauciæ partes fractis aut luxatis ossibus molestantur, ut & cum fasciis, spleniis, laqueis, ferulis, aliove apparatu deligantur arctius, sicuti & sæpissimè cum turundis, aut linteis carptis quibuslibet, sinus ac partium suppurantium alveoli ultrà modum vique immani, ut aliquibus Chirurgis solemne est, opplentur, dilatantur, divelluntur.

10°. Si inspissentur fluida in solutâ parte, ac torpeant, motus vasorum vitalis languebit aut extinguetur, liquamen verò in vasculis ruptis elaborandum crassius factum sanorum pulsantium pressuris nimis obsistet, easque evanidas efficiet, hinc vel languida, aut caduca demùm suppuratio. Eâ ratione frigidus aër partibus suppurantibus molestus adedò & adversus. Eâ ratione admotâ intempestive Repellentia, quæ dicuntur, medicamina suppurationem sistunt; ità & venena quædam vulneribus affusa suppurationem prohibent, aut si inceperit, cohibent. Hæque similesve causæ, si valdè noxiæ, in his interdùm gangrænam procurant,

interdum indurationem; & quidem gangrænam si subito humorum fluentium in vasis suppresserint; indurationem verò, si paulatim egerint, eoque tempore liquorum major pars aliò deviarit.

11°. Si sanguis solutas partes alluens serò ac mucilage tenui (hanc *Balsamum* vocant) depauperatus sit, vix aliquam vasculis ruptis materiem suppurationi idoneam, eamque insuper tardè ob crassitiem suppeditabit. Aut si serò licet absolutè non egenus, mucilage hâc molli ac extensili tamen destitutus particulas duras, crassas & acres sui juris factas, sinu suo ubertim vehat, tunc vasculorum fibræ mucilage sufficienti haud emollitæ tensæ ac rigidæ necessariò fient, tum etiam quandoque particulis acerbis vellicatæ in contentionem inassuetam cum accedente fervore suscitabuntur, & orientur casus, art. 7. & 8. In hujusmodi ergò cruoris discrasis tardæ ac parvæ producantur suppurationes. Hinc fit ut qui temeto, speciebus aromaticis, iisve affinis indulgere nimis, cum fuerint vulnerati suppurationes patiantur tardigradas & parcas; hinc Hæcticorum vulnera humentia parùm deprehendes.

12°. Si mucilage tenui æquabiliter dispersâ, partibusque spirituosissimis plurimum orbatus sit sanguis, utcumque reliquæ se habeant, partium solidarum textus vix elatere donabitur aliquo, sanguis autem vascula alluet non æquabiliter, ut decet, subviscidus, nec particulas diversas, quibus constat, intimè ac uniformiter dispersas commixtasque sinu suo gerens, adèò ut hîc crassæ aderunt viscidæ nimium ac tenaces exsolutionem sui haud patientes, serosæ illîc solutæ à reliquis, plurimum fluxiles, hîc duræ nimirum molis muriaticæ nimirum ac lixiviales, neutræ mucilage tenui ceu vitali balsamo debite temperatæ; verbo particularum nexus, qui vitalem formam tribuit sanguini, ferme solutus erit, proximaque in eo ad cadaveris statum dispositio aderit. Ex quibus tunc nonnisi languidæ admodum expectandæ suppurationes, quin plurimum imminebunt partium fiderationes. Hoc pacto se rem habere observamus in praxi, cum, post passas diu malignas febres putridasve, aut ex recidivis protractas, nec perfecte judicatas, præprimis cum imperitè, aut etiam fatali quâdam necessitate ad

præcavendum infelicem exitum , repetitis
 nimiùm validis catharticis ac vomitoriis
 tractatæ fuere , effœtus prorsùs sanguis
 factus est. Hinc senes potissimùm eventus
 hosce funestos ab ejusmodi morbis expe-
 riuntur , cum jam vietus sit sanguis eo-
 rum ; quin & interdùm absque prægres-
 so morbo ob senium commissosque per
 vitam diù protractam in usu rerum non
 naturalium errores , sanguine , qualem
 descripsimus , ità vitiato donantur , ut
 fauciatis compressive tantillùm partibus
 aut suppurationes languidas aut gangræ-
 nas protinùs patiantur , quin etiam ali-
 quandò hæ absque prægresso causæ ul-
 lius externæ incurfu , quasi spontè ex-
 citentur.

C O R O L L A R I A.

I.

In solutis partibus aut non excitabi-
 tur aut languebit suppuratio , nisi per
 vasa minima difficulter utcumque fiat
 fluidorum transitus , ac ea utcumque in-
 farcta sint.

II.

Sed & cùm infarcta notabiliter erunt
 sanguifera , cæteraque intertexta vascula,
 vegetè tamen non procedet suppuratio,

nisi vasculorum, quæ integra mansere, vis activa vitalis ruptorum fluidis inertibus tumentium resistantiam multum superarit; cum autem ruptorum turgidorum resistantia pulsioni sanorum superior existet, aut suppurationem languere, aut si resistantia hæc ulterior fiat, mortificatione partem tentari eveniet. Mortificationem diceres in solutis partibus suppurationem oppressam, utque vitæ partis certum est tekmerion suppuratio, ita hæc oppressa extinctionem ejus sæpè significat.

I I I.

Quare in jam memorato statu, suppuratorii operis impedimenta ad nimiam liquaminis in ductibus ruptis elaborandi resistantiam, ac insufficientem vasorum integrorum vim pulsivam ultimò revocari possunt; adeòque causæ remotæ, quibus tunc suppurationes impediuntur, languent, cohibentur, producendo duplici huic vitio aut alterutri semper collimant.

I V.

Sed & languidæ fluidorum tum per integra cum per vasa rupta effusiones, ac paræ liquorum suppurandorum ema-

nationes languidas suppurationes aut nullas efficiunt.

¶

Cùm solutæ partes ac fluidis turgidæ, per suppuratorium opus priùs liberandæ sint, quàm ad nexum suscipiendum dispositæ fiant, adeò ut suppuratio reipsâ naturæ conamen sit, quo soluta pars sarcina expeditur noxiâ, in enumeratis universis suprâ suppurationis casibus consequitur partium solutarum unionem ægrè ac segniter perficiendam, quin & cicatricis efformationem, quamdiù persistet in languore suppuratio aut erit suppressa, nullatenùs excitandam fore. Sic quamdiù suffocata est suppurationis causa efficiens in oris vulnerum induratis, aut siccis, aut ad fiderationem proclivibus, partes hiulcas aut laceras miserè conspiciendas tamdiù se præbent, ac labris callosis vel aridis, vel putrilagine molli, vel escharâ defœdatis.

PROPOSITIO II.

*Cur incipiat diversimodè , succedat-
que in partibus mollibus suppuratio , exponere.*

IN suppuratorio quovis opere etiãsi essen-
tialia quædam constanter observentur,
nimirum in ejus prodromo suppuraturæ
substantiæ partis insolitus tumor cum ca-
lore , rubore , dolore ; liquaminis puru-
lenti deinceps effusio ; hinc postremò no-
varum carniū succrescentia succedere
soleat ; symptomata tamen antecedentia
hoc opus & concomitantia in variis ca-
sibus diversa , purulenta liquamina indo-
le variã prædita , carniūque progenera-
tiones tam inter se discrepantes , quin &
interdum suppressas , in praxi Medico-
Chirurgicâ observare adè familiare est ,
ut sanè hujusmodi variationum & ano-
maliarum in causas inquirere , quò in vul-
neribus deinceps ; ulceribus ac tumori-
bus certius signa prognostica institui , tu-
tò autem ac efficaciter auxilia partibus
suppurantibus afferri queant , haud exigui
sit emolumentum.

Neque tamen universas , quæ occurrunt in praxi , suppurationis varietates & anomalias recensere , multò minùs causas earum omnium indagare constituimus. Præcipuas autem , & ad quas cæteræ velut ad summa capita revocari haud difficili negotio possunt , expendere in tentamine hoc solùm animus est. Partium constitutio naturalis diversa , affectiones sanguineæ massæ præternaturales , solidorum ac fluidorum in parte ipsâ suppurante labes , modus quo continuum solutum est , partes suppurantes curandi ratio , hæc sunt præcipua , cur inchoetur diversimodè suppurationis opus , cur diversimodè succedat.

Jàm eam suppurationis formalitatem attigimus , cur ea interdùm difficulter aut etiam nullatenùs excitaretur , quin imò cohiberetur incepta , sisteretur aut lentè procederet ; impotentem nimirùm , fatigentem aut oppressam in opere hoc naturam præprimis illustravimus ; nunc eam depravatè agentem (ut Pathologorum sermone utar) considerare animus est , postquam ejus operam in partibus naturaliter variè constitutis variam ostenderitimus. Neque enim molles corporis humani partes

tamen si optimè se habentes, pus ejusdem indolis eodemque modo promunt, utque constant vasis diversis, diversis & alluuntur liquoribus, ità & variam operam in suppuratione præstare eas necessum fit.

Itaque 1°. carneæ partes, ut sunt musculosæ, cutaneæ, ac similes, utpotè molliculæ ac sanguine lymphâque ubertim irroratæ, absque passis inflammationis tempore gravioribus symptomatis, liquamen mucilagineum facilè fundunt, spissum mediocriter, ac æquale; ruptorum autem vasculorum extrema in putrilaginem albicantem mollem citò abeunt. A talibus ergò partibus solutis & infarctis pus haud difficili negotio ac properè satis emanare solet, copia debitâ, spissum modicè, mitis indolis, albicans, æquale, læve, nihil olens, omninò dotibus puris *laudabilis* potiens. Tùm si nihil obstiterit egressui puris, parsque cùm fuerit deterfa, carnes laudabiles sat vegetè succrescunt, optatò succedit cicatrix.

2°. Tendineæ verò partes, utpotè tensæ plurimùm nerveisque staminibus consitæ in suppurationis procinctu doloribus admodùm cruciantur, hinc vigiliæ, febris intensa ejusque effectus, hinc etiam

Spasmi partium, hinc & quoque staminum partium articularum contractilium tensiones insolitæ, cohibitiones sanguinis fervidi in vasculorum extremis, adeoque stupendæ & extensæ admodum in partes vicinas inflammationes, quas cum vascula ultramodum distenta fuerint consequitur sæpè gangræna, (Conf. art. 4. prop. 1.) Cum autem vascula in tendineâ compage naturaliter plurimum, ulteriùsque adhuc tunc ex intenso dolore tensa sint, cum insuper strictè simul adunata, nec sanguine, legitimi puris materiâ præcipuâ, ubertim irrorata, in partibus tendineis non nisi ægrè procedet suppuratio (Conf. art. 2. & 8. prop. 1.) pulque manabit non ità spissum ac in partibus carneis, non ità albicans, nec, ut aiunt, æquè *concoctum*, tenuius autem, tenax tamen ac viscosum, fluidorum lymphaticorum soboles, quibus tendines præprimis scatent.

Ut autem suppurationibus molestis obnoxii sunt tendines, ità & deterfiones patiuntur tædiosas: quòd sanguineis vasculis paucioribus donati, & liquoribus lymphaticis lentè transfluentibus irrorati, causam liquaminum expultricem debilem in se gerant (Vid. art. 2. prop. 1.) quòd

insuper stamina superficiei vulneratæ tendinis quamplurima ultramodum priùs ex dolore tensa ac in textu intimo lacerata, post sedatas suppurationis turbas deterfionis tempore arefcentia è sanorum conubio pulsionibus eorum sensim sejungenda sint, & in modum lamellarum extrudenda (in quo quidem opere, quod tendinis *Exfoliationem* vocant, plurimùm sanè temporis insumitur) quò deinceps è subjectâ vivente tendinis substantia carnes sui moris ad cicatricem efformandam promi possint.

3°. Nervosæ ac tensæ plurimùm partes membranæ, ut membranæ communes & propriæ musculorum, periostæa, cùm suppuraturæ sunt, doloribus vexantur atrocissimis, hinc similia mox dictis symptomata. Undè autem acuti adeò dolores, nervosarumque partium tensiones adeò validæ & irregulares, quæ vigiliis, spasmos accersant, inflammationesque horrendas suscitent, cùm nervus punctus, aut laceratus, nec tamen integrè resectus est? Ea exin pendent, quòd cùm nervus è plurimis fibrarum fasciculis per fibrulas membranæas laterales connexis compaginetur, fasciculi nonnulli resecari non

possint , quin in semet retracti (prout universis corporis viventis staminibus insitum est) per ligamina hæc lateralia intactos trahant , tendant , divellant , hinc immania hæc nervosi sistematis symptomata , quæ resecto penitus nervo sedantur , quòd tunc nullæ relinquuntur amplius nervæ fibræ , quæ distendi ac divelli possint . Eadem circà tendinis puncturam concipe . Difficiles igitur ex his omnibus summèque molestas fore in nervosis partibus suppurationes inferre datur . Hæc autem liquamen purulentum paucum , nunc tenue & albicans , interdùm fuscum , rubellum , dilutum , quasi saniosum , prout fert hujusmodi partium natura , paucò sed tenui cruore vel levi de causa diffundendo , succo autem lymphatico elaborato irriguarum , suppeditant ; cùm autem liquamen è nervorum truncis potissimùm extillat , tenue est subviscidum & potius lymphaticæ quàm purulentæ indolis , idque *Ichor* nominari solet . At postquam suppuratæ sunt nervosæ partes , succo lymphatico tenui continuò effuso diutiùs hument , à quo emollitis efflorescentibus carneis granulis , iis autem tenuibus , (ut fert partium ejusmodi textus) ferrumi-

natio solutæ partis procrastinatur.

4°. Ligamentosæ , aliæque partes circum articulos , cum maximâ parte sensibiles valdè sint , ingruente suppuratione ob dolorem intensum similia quoque dictis inferunt symptomata ; tùm liquamina purulenta promunt ocyùs , quod hæ partes cruore parùm perfusæ sint (Conf. art. 2. prop. 1.) eaque non æquabilia , quod abundanter ipsis admixta sint lymphatica fluida spissa è ligamentis , vaginis tendinum , & perichondriis assiduò depluentia , quæ *synoviam* ex Paracelso barbari nuncupant. Porrò fluida lymphatica hæc obstinatè nimis ab his partibus depluentia detersioni plurimùm obstant , ulceraque illarum sanatu difficilia adeòque tædiosa efficiunt , quamobrem nonnisi serò expectandæ tunc cicatrices.

5°. Adiposæ partes , ut omentum , membrana adipis subcutanea , ac similes in suppuratione admodùm languent , pus ægrè profundunt , idque lentum , facile verò gangrænâ corrumpuntur. Cur ? Quòd in hujusmodi partibus vascula luxurient mollia , flaccida , cellulosa , liquore spisso , pingui , tardigrado turgida , quibus quidem unà cum sanguineis disruptis , quæ integra

in textu membranarum adiposarum remanent sanguinea, utpote pauca gravantur plurimum ac vel oneri succumbunt, unde partis mortificatio (ex corol. 2. prop. 1.) aut vitam in parte vix fovent, quamobrem liquaminis nonnisi spissi ac lenti ex materia spissâ ac pingui præprimis efformandi progenerationi ansam præbere possunt. Hisce de causis præcipuam corporis habitûs gangrænarum sedem in membrana adipis subcutaneâ quæras. Similes ob rationes testes molestas ac tædiosas patiuntur suppurationes, sæpè autem corrumpuntur, præcipuè cùm fuerint attriti. Sic & cerebri substantia tenera liquore nerveo lentè fluente irrorata suppurationem vix ferre potest, citò autem ac facilè huic operi succumbit, ac corrumpitur. Cùm autem è suppurationispartibus his molleculis carnes pullulant, hæ mollitiem ac flacciditatem nativam non deposuerunt, quin & frequenter citiùs ac præcipitanter vegetant, quod vascula, quibus constant, ex propriâ constitutione jam valdè mollia, sed & in opere suppuratorio dilatata ac defatigata, fluidis tunc accedentibus distendi se ac ultrâ metas produci facilè patiantur, hinc

tumentes carnes , molles , flaccidæ , hebetes , quas à similitudine substantiæ *Fungosas* nuncupant , è quibus quidem carnibus solida partis solutæ ferruminatio effici nequit.

6°. Glandulosæ partes lymphaticæ , quas *Conglobatas* ex Malpighio vocare solent , cùm vasculis lymphaticis protractis ac plurimùm inflexis potissimùm constant , paucioribus autem sanguineis intertextæ sint , lentè suppurant (Conf. art. 2. prop. 1.) Idcirco ob iners opus lymphamque , quâ scatent , facilè concrescibilem indurationes sæpè ac scirrhosas concreciones exhibent , undè pus ab eis frequenter spissum ac ægrè manat , quodque oris ulceris induratis facilè supprimitur. In eo autem obstructionis statu fieri non possunt vasculorum promotiones utpote inextensibilem , fierique non possunt carniū efflorescentiæ , at suppurata pars oris duris (has *Callosas* vocant ,) prædita , tandiùque soluta manet. Si verò oratum ulceris induratio ad tantum gradum haud evecta sit , lentè saltem ac ægrè fiet vasculorum & carniū promotio , tardè fiet in partibus his glandulosis cicatrix. Siquè tandem levior extiterit obstructio , ob re-

moratum tamen lymphæ in his partibus uberis reditum, vascula ejus ultràmodum in oris ulceris tumebunt, ultràmodum promovebuntur, carnesque exhibebunt nimis evecatas, inæquales, efformandæ cicatrici parùm idoneas.

Haud parùm dispari ratione res se habet suppuratoria in salivalibus glandulis, aliisque affinis, quæ succis lymphaticis scatent, iis autem plùs minùsve inertibus, viscidis ac languidè intrà vasa motis, expressis.

Modo memorato rem utique se habere observamus cùm suppurant glandulæ inguinum, axillarum, mezenterii, pulmonum, aliæve lymphaticæ iisque affines, ut & parotides, tonsillæ, ac similes.

Jàm verò sanguis universalis ille liquor, ut præcipua legitimi puris materies, ità & causæ ejus efficientis rector præcipuus; prout enim ad fluxum ex crasi propriâ diversimodè dispositus erit, ità sanè pulsiones vasorum, quibus continetur, varias in parte mox suppuraturâ aut suppurante efficiet, ac prout qualitatibus variis imbutus erit, sic & profectò versus in liquamen eas diversas exhibebit in

pure dyscrasie conceptæ servator obstinatus. Præcipuas insignioresque ejus, quibus fiat, ut diversimodè suppuratorium opus incipiat, procedatque dyscrasias perpendamus.

7°. In sanguine benè constituto globuli rubri fibræque mucilaginosæ quantitate debitâ, convenientique inter se cohæsionis gradu in liquore innatant ac voluntantur seroso viscidiusculo; quare fluidum ex tali miscelâ emergit subviscidum, æquale, ac benè temperatum, quod justam tensionem tribuit vasculis, suâque resistentia ad tranfluxum ipsorum viribus proportionatâ eorum activitatem sfovet. Cùm igitur supputationis casus aderit, vascula integra vividè pulsabunt, humorque purulentus ex attritis, delectisque in ruptis ductibus globulis rubris, hinc cum mucilaginosi lymphatici vehiculi fibrillis seroque intimè mixtis compactisque simul, ortus, manabit vegetè, spissus, æqualis, lævis, sordè nullâ inquinatus, nihil olens, omninò pus fiet laudabile; perennante autem vegetâ causa supurationis soluta pars purulentâ pulte penitùs purgabitur, detergetur; Vasculaque sana deinceps pululabunt firma, tùm sanguinea, tùm neu-

ro-lymphatica passu æquali , presso procedentia , semet invicem fulciantia , ex quibus granula carnea conficiuntur florida , valentia , optimaque ex his implicatis stabilietur cicatrix.

8°. In sanguine dissoluto globulorum acervi ex paucioribus constant , fibræque mucilaginosæ in tenues nimis flocculos divisæ sunt , quamobrem particulæ hujusmodi à cohæsione nimis liberæ facilè hæc & illæc serò vectæ diffluunt , nec visciditate sufficienti præditæ , & ad transfusum nimis habiles ductuum vi systalticæ vix obstant , hinc tunicæ eorum à tali cruore parùm diductæ , parùm restituntur , visque proindè vasorum pulsiva parva est nec vivida , parva ergò ac debilis suppurationis causa efficiens. Præterea istiusmodi cruor per vascula rupta facilè diffluit , nec in extremis eorum sat diù moratur , quò vitalis motûs defectu inspissari , posteaque in pulvem purulentam æquabilem à ductibus sanis pulsantibus subigi queat , quin per extrema vasculorum ruptorum globuli nonnulli rubri aut lutei ob exiguitatem solutamque à partibus cæteris cohæsionem facilè dilabuntur , ac liquamini purulento interdum commiscen-

tur integri, ex sanorum ductuum pulsionibus nihil attritionis passi, colore proinde non exuto, illudque tingentes. Quas ob rationes in assignatâ sanguinis constitutione pus incoctum, hoc est non elaboratum è vulneribus profluet, tenue, inæquale, sæpèque saniosum. Carnes autem enascentur postmodum teneræ, ruberæ, laceratu faciles, cruorem facilè fundentes, è vasculis sanguineis potissimum textæ facilè extensis, cruore tenui turgidulis, ductuumque neuro-lymphaticorum fulcro valido destituis, quod hi ad firmitudinem suscipiendam lymphâ crassâ satis careant; Hinc demùm cicatrices molles, facilè solubiles.

9°. Cruor crassus & viscosus globulorum acervos sinu suo gerit præcrassos, tum & fibras magnas arctè nimis inter se & globulis cohærentes, particulas utrasque ferum inter seipsas potius irretientes, quàm in eo, ut decet, volutatas. Hinc fluidum vascula vi magnâ distendens, utpote transfluxui nimis obsistens, & particularum suarum dissociationem vix patiens, Sanguis insuper itâ constitutus è vasculis ruptis ægrè diffloit, plurimùm in eis moratur, crassitiemque insignem adipiscitur;

At tandem sanorum ductuum vi vegetâ exagitur, exprimitur versus in liquamen purulentum lentum, crassumque, intereâ elaboratum & concoctum. Ad deterfionem autem insumpto tempore paulò longiori, carnes deinceps emergunt tardo passu, sed firmæ, utpotè vasculorum sanguineorum ac neuro-lymphaticorum robustorum & cruore lymphâque lentis ac viscidis plenorum soboles; Hinc cicatrices firmæ, duræ, sed aliquantùm principò tumidæ.

10°. In Cachecticorum sanguine parca est rubra pars, occurrunt interim hîc & illîc globulorum acervi quidam crassi, luxuriat autem fibrosa, præcrassa, parùm extensa, & quasi in semet coarctata; hæ autem duplicis speciei partes sero copioso innatant, eoque velut immersæ sunt. In tali autem constitutione sanguinis vasorum languet motus vitalis, quòd facilè à cæteris disfluant serosæ partes, partiumque stamina emolliant, crassæ autem hîc & illîc non præterfluant, & obstructions excitent, quibus enervatur sanè vasculorum motus. Sed & talis indolis cruor in ruptis ductibus æquabiliter non hæret, ab eo enim facilè disfluit

serosa pars, crassa autem ex globulorum acervis fibrarumque flocculis nimis constans obstinatè nimis in illis impacta manet, pulsione ductuum sanorum languidâ parùm subigenda ac nonnisi identidem exprimenda. Quibus fit ut suppuratio langueat (Conf. art. 6. prop. 1) tùm pus non æquale suboriatur, nimirùm partim serosum ac tenue, partim crassum, adeoque quasi grumulis refertum; deterfio similiter ægrè peragatur; succedant deinceps carnes molles, flaccidæ, inæquales, evanidæ, pallentes, ductuum minimorum sanguine parùm vivido, parùm rutilo, seroso autem, ac particulis crassis aliquibus inæqualiter onusto, lymphâque similis indolis, refertorum, quorundam obstructorum, reliquorum liberorum ac præmollitiæ faciliùs extensilium soboles. Undè cicatrices aut impossibiles, aut debiles parùmque perfectæ, quæque nonnisi longo temporis spatio absolvi possunt.

11°. In sanguine cacochymo, utut is ex pluribus pravæ molecularum combinationibus ità nominetur, molecularæ globulorum ut plurimùm fluitant malè digestæ, crassæ hîc, alibi tenues, exque mucilagine molli conglobatâ mitis indo-

lis simpliciter, ut decet, non constantes, sed & particulis salinis duris præcrassis plurimum consistæ, tum inter eas innatant fibrosæ partes inæqualiter crassæ, inæqualiter expansæ, quibus nimiâ copia adhærent salinæ partes indole variâ præditæ, hisque omnibus vehiculum est serum variè in variis casibus salinum, solutum penitus interdum, interdum viscoso-salinum. In hujusmodi autem constitutionibus, aut languet motus sanguinis periodicus, languetque motus vasorum vitalis, aut etiam interdum per vascula quædam incitato nimis passu procedit cruor, quo tempore per minima nonnulla difficulter meat, nimirum cum comes adest febricula, vasculaque minima tunc plurimum sollicitata sunt, tensa, defatigata. Quas ob causas in corporibus cacochymis aut languentibus suppurationes (Conf. art. 11. & 12. prop. 1. & 10. prop. hujus) & liquamina purulenta manabunt incoc-ta, inæqualis consistentiæ; aut etiam ex oris ulceris profluent qualitatibus variis prædita nimirum foerentia, variis coloribus tincta ut flavo, viridi, iisque affinis, item diversimodè acris, oras ulceris vellicantia, irritantia, molestantia, tum & nonnunquam

nonnunquam immani vi rodentia, depascentia; insimul liquamina hæc consistentia inæquali prædita erunt, adeò ut fordes crassas in hâc ulceris parte, in hâc fluidum tenue, acre, depascens substantiam partis exhibebunt; hîc ulceris oræ deprehendentur præduræ, callosæ, scabræ, ubi nimirum ductuum neuro-lymphaticorum notabilior erit ex moleculis crassis infarctus; hîc carnes molliculæ erunt nimisque extantes, ubi lymphæ serosior salina neuro lymphatica valdè penetrarit. Conspicientur ergò ex istiusmodi apparatu vario ulcera fordida, fœtenta, verminosa, cancrosa, cacœthea, Telephia, Chironia, virulento potiùs quàm purulento humore manantia, horrenda visu. Nec legitimarum carniùm expectanda ex oris ulcerum hujusmodi pullulatio, vix enim priùs in eis aut interdum nunquam peragi potest deterisionis opus (quod inferiùs, ubi de supputatione cancri, fusiùs declarabitur) Carnes autem, ut jam diximus, progenerabuntur in eâ parte præduræ, in hâc molliores, saniosæ simul commixtæ, fordidæ, & quidem maximâ cum obstinatione artisque contumeliâ, ex quibus nulla cohæsiõ, nulla est

matrix effici potest, aut laxa duntaxat,
ac facile solvenda.

12°. Scorbuticorum sanguis partibus
activis depauperatus est, tum & mucil-
laginosis tenuibus, quibus expansis æqua-
bilis nexus particulis reliquis tribuitur,
globulorum autem acervi compacti sunt,
ac in serò muriaico nimis, partibusque
fibrosis crassis referto innatant. Languet
autem in scorbuto affectorum partibus
fauciis vasorum integrorum motio vitalis,
quòd mucilaginositate æquabiliter expan-
sâ vasa uniformiter tensa non sint, at po-
tius moleculis crassis obstructa, serosis ve-
rò relaxata particulis è cæterarum con-
nubio elapsis. Suppurationes igitur in scor-
buticis vegetè non peragentur (Conf.
art. 10. hujus prop.) è ruptis autem duc-
tibus liquamina manabunt viscida, inæ-
qualia, falsuginosa, corruptelam morâ fa-
cilè concipientia. Sed & cùm vascula
fana globulis compactis attris, tum & fi-
brosis falsuginosis particulis ægrè meanti-
bus continuò infarcta tandem nonnulla
rumpantur, in ulceris superficiem sanies
atra falsuginosa velut amurca quædam fec-
torem morâ & corruptelâ induens idem-
idem effundetur, hinc pus scorbuticis

inæquale , faniofum , foetidum , cadave-
 rofum. Cæterùm in oris ulceris vascula
 fanguinea atro cruore , neuro - lymphati-
 ca verò viscofâ & falſuginofâ lymphâ
 turgida , carnes tumidas , quæ vel mini-
 mâ vi difrumpantur , efficient , idcirco
 ulcera tunc conſpicientur livida , putrida ,
 ſerpentia , foetore ingrata. Ruptis autem
 hiſce carnibus tumidis , novæ protinus
 pullulabunt molles , *fungoſæ* , quòd ora-
 rum ulceris vascula moleculis craſſis ſem-
 per gravata ſint , ſero autem falſuginoſo
 continuo emollita , hinc plurimùm diſ-
 tenſilia ac turgentia , quæ iterùm facilè
 lacerentur , & ſaniem hoc eſt globulos
 rubro atros falſuginofâ lymphâ dilutos fa-
 cilè fundant , hinc obſtinatè humeſcent
 ulceris oræ & ad deterſionem abſolutam
 difficilè duci poterunt , quas ob rationes
 cicatrix aut nulla , aut tardè ac difficilè ,
 aut mollecula progenerabitur.

13°. Cùm in conſtitutione ſanguinis
 ſyphiliticâ luxurient concrectiones quædam
 lymphaticæ tenuitate inſigni , ſumma au-
 tem duritiæ præditæ , quæ minima quæ-
 quæ ſanguifera vascula præterfluant , cæ-
 tera verò minora adhuc , ut partium mol-
 lium ſecretoria ac præcipuè neuro-lym-

phatica, ossium autem propria adeò facile pervadere nequeant, in iisque vasculis obstructions unicâ tantùm summèque efficaci arte debiles frequenter pariant, obstructions omnium symptomatum venerorum causas; sequitur suppurationes in lue venereâ infectis (cùm contigerint à quâlibet causa occasionali in parte floridè nutrita vasculorum sanguineorum cæterorumque ruptio ac infarctus) non minus vegetè quam in non infectis incepturas prægressurasque, quòd concretiones veneræ cruoris activitati, vividisque vasculorum sanguineorum pulsionibus ex seipsis nullatenùs obstant, nihil proindè causam suppurationis infringant ac immutent. At cùm aliquandiù processerint suppurationes ejusmodi, ac vascula quæque solutæ partis difficili fluidorum transitu defatigata fuerint, sanguinea equidem quadantenus liberari possunt, at neuro-lymphatica concretionibus venereis succubere, quod non mirandum cùm quævis corporis neuro-lymphatica utut sana nihilque lacescita iis obstui plurimùm obnoxia sint. Itaque post tempus aliquod arescunt quadantenus ulcera venerea, nec tamen curantur, utue

enim juxtà ea aliquo modo restituantur cruoris circuitus, cessetque gravis inflammatio, cursus tamen succi lymphatici impeditus valdè remanet, hinc absoluta nulla ulceris deterfio, hinc nulla vasculorum neuro-lymphaticorum, quæ carni succrescentium in vulneribus præcipua materies sunt, extensilitas optata, hinc non progenerabuntur carnes, manebuntque duræ ulceris oræ aliquid liquaminis aut vix aliquid effundentes, inextensiles, callosæ, unionem nullam in solutâ parte procurantes. Si autem erupisse vascula suanguifera è neuro-lymphaticorum hærente succo concreto, deside, turgidorum, induratorum compressione liberata contigerit, ac in grana carnea effloruisse, hæc inæquali passu progredientur, nec firma erunt, quòd fulcro debito, stamine nimirum neuro-lymphaticorum socio careant; hinc carnes quidem erumpentes, sed flaccidæ, humentes, sordidæ, in monticulos disgregatos hinc & illinc distinctæ unionem partis arctam excitare non valentes. Quamobrem in utrolibet casu ulcera venerea ex seipsis ad cicatricem duci vix eveniet, obstinatè autem partem defœdabunt.

Sed quamquàm lue venerea infectus causæ cujuscvis procatarticæ vulnerantis incurfui perindè ac non infectus obnoxius fit, indèque in parte quâlibet corporis vulneratus suppuratione moleftari queat; sæpè tamen evenit suppurationes fyphiliticas in partibus præprimis lymphaticis, aut iis analogis quasi spontè excitari; ac res ab internâ causa tunc repetitur; concreciones enim venereæ, ut jam dictum est, cruoris vascula liberè permeant, exigua autem lymphatica aut similia, utpotè tenuiora obstruunt, hinc eorum disruptioni postmodùm ansam præbent, sed & ab iis ingurgitatis premuntur exigua nonnulla cruoris vascula, ingurgitantur hæc pariter, rumpuntur tandem, sicque excitatur suppuratio, sæpè autem tardigrada (ex art. 2. prop. 1.) nec uber, contumax autem, ex quâ partis reparatio, ob vasculorum neuro-lymphaticorum concrecionibus summè duris obstructorum & quasi induratorum inextensilitatem, adeòque cicatricis efformatio præpeditur.

Cùm autem ex labe venereâ suscitari suppurationem repentinam, citam, ac uberrimam, ut in gonorrhæis ac bubonibus quibusdam venereis observare est, interdum

evenit, illud infectioni summæ ac repentinæ tribuendum, ex quâ concretionibus venereis partes nonnullæ speciatiim adeò ubertim infestantur, ut pressio subita ac notabilis ex vasculis lymphaticis aut secretoriis feminalibus pluribus ità subitò obstructis, ductibus sanguiferis inferatur, iique proindè à retardato, & æstuante ut plurimùm in his partibus, cruore nimium distenti, unà cùm cæteris principio obstructis, protinùs plures disrumpantur, undè uber puris materies, causaque cita suppurationis ac vegeta.

Colorem autem flavum, viridem, aut affinem quo inficitur pus syphiliticum, quod spectat, hunc ab admixtis ipsi concretionibus venereis pendere existimamus.

14°. Nimis sibi cohærent in diathesi sanguinis serophulosâ particulæ quæquæ sanguinis; illaque cohæsiō in particulis lymphæ mucilaginosæ præprimis eminent, adeò ut fluidum hoc viscositate nimia nec facilè delebili præditum sit. Cùm ergò casu succedent in strumosis suppurationes, hæ quidem per tempus aliquod sat vegetè procedent, quòd vasa sanguifera principio sat vividè pulsant liquoresque ultra

modum in vasculis impacti non sint; cum autem tempus aliquod fuerit elapsum (imprimis si auxilia efficacia ad suppurationem juvandam adhibita non fuerint) rupta vascula lymphatica contenti humoris viscositati ut plurimum succumbent, infarcentur, penitusque expurgari vix poterunt, hinc deterfusio difficilis, oræ callosæ, ulceris perennitas.

At ut absque causæ externæ incurfu in lue gallicâ laborantibus, suppurationes per sæpè vi clandestinâ suboriuntur, ita & in strumosis idem observabis; propterea quòd lymphæ viscosæ nimis particularum à vi vasorum pulsivâ exsolutionem sufficientem ad transitum haud patiens in minimis vasculis lymphaticis levi de causâ hæreat, infarctat ea dirumpat, tum ex tumore ipsis illato comprimantur sanguifera, nonnullaque ex his deinceps ingurgitentur, rumpantur, sicque suppurationis casus excitetur, prodromus autem suppurationum ejusmodi diù protrahetur, quòd sensim promoveatur vasculorum infarctus ac pulsio; parique de causa suppuratio lento gradu procedet, tum & quòd suppuranda liquamina in vasculis ruptis crassa sint ac viscosa, vasculo-

rumque integrorum pulsiones magnoperè eludant, hinc parùm vegetæ strumosæ suppurationes, diù protractæ, turbæ nihil aut vix quicquàm inferentes, quasi abditæ; hinc demùm ex lentore illo orarum ulceris induratio, tumor, ulcus diutinum, cicatrix difficilis.

15°. Cùm urget febris, cruor liquorisque cæteri per vasa minima ægrè meant, ac ex illato obstaculo is potissimùm ad fluendam per vasa majora incitato cursu compellitur. Cùm ergò suppurationi comes erit febris, solutæ partis vasa minima multùm ingurgitabuntur, plurima rumpentur, majora autem (cùm infarctus nimius non erit) vividè micabunt, suppuratio procedet vegeta, abundans, excitata si languida priùs extiterit, sic incitantur interdùm febre superveniente suppurationes in bubonibus, fiuntque abundantiores; sic ad suppurationem ducuntur interdùm Scirrhusi tumores, qui priùs absque tumultu ullo quasi sopiti erant; sic plerùmque tumores quivis Phlegmonodei ex febre acutâ intensiùs suppurefcunt. Cùm autem ultràmòdum infarctus evectus fuerit, vasa quæquæ nimiùm tensa erunt, onerique fluidorum succumbent,

hinc suppuratio suppressa (Conf. art. 4. prop. 1.) tunc itaque arefcet suppuranda pars, plurimum tensa, tumida ac æsttuans, aut si demùm infarctus febrilis tantus sit ut penitiùs textus partis lace-retur, hæc gangræna tentabitur; casus hujusmodi observantur interdùm in vul-neribus, cùm intensa excitatur febris, ut & in variolis, dùm ex accensâ præ-termodùm febre papulæ cutisque ità æst-tuant, ut suppuratio quali suspensa ma- neat, quin etiam gangræna interdùm su- boriantur.

Ociosum esset nimis in plures adhuc excurrere sanguinis dyscrasias. Quas ex- pendimus, eæ præcipuæ sunt, quibus suppuratorium opus varium efficitur. Cæ- teræ autem quâ ratione ei varietates in- ferant, ex antedictis eruere haud arduum erit.

Varietates jam suppurationis & anomalia- las præcipuas sub eâ formalitate dispi- ciamus, quâ ex labe fluidorum & soli- dorum in parte ipsâ suppurante concep- tâ producantur, sive fluidorum vitia hæc ab universali massa foveantur ac pendeant, sive ex causa quâcumque in parte ipsâmet duntaxat, aut præprimis fuerint contracta,

16°. In Phlegmone sanguis agnoscitur spissus, rarefcens, tumidus, vascula minima ægrè percurrens, eaque plurimum implens, hæc autem sic dilatata magno- perè tensa sunt, vibrantque vehementer. Hinc cum ruptis eorum nonnullis suppurationis casus orietur, hæc sat vegetè succedet, pus spissum & concoctum erit, album, liberaliter manans; deindè verò ad deterfionem tempore sufficienti insum- pto, carnes postea pullulabunt firmæ, è textis simul sociatisque vasculis sanguineis ac neuro lymphaticis validis æquali pas- su simul procedentibus utpotè constantes, solida fiet cicatrix.

17°. In Erysipelate sanguis adeò cras- sus non est, at fervidior, vasa minima adeò non inflans; hæc autem plurimum stimolata sunt, plurimum tensa, non tam à fluidi ægrè transmeantis mole, quàm ex molestiâ ab stimulo sanguinis acris & fervidi ipsis illatâ; cum ergò rumpuntur vasa, plurima simul dilacerantur, undè subitæ ac inauspicatæ suppurationes, in quibus pus fluxile ubertim manans obser- vatur, nonnunquàm subflavum ex admix- tis nimirum globulis aliquibus cruoris in vasis ruptis præ tenuitate sufficienter non

retentis, nec proinde à suppurationis efficiente causâ penitus deletis, mutatisque. Fervore interim molesto comitatæ sunt hujusmodi suppurationes, tum & purulento liquamini commiscetur sæpè serum aliquod acre, fervidum, fluidorum lymphaticorum à perspiratione acri erysipelatis nimis attenuatorum, hinc faciliori laice è ductibus propriis ruptis manantium soboles; Quo quidem sero pus fluxilius adhuc, quin & nonnunquam rosivum efficitur. Quocircà & detersio molestè peragitur; à fervore siquidem partis liquamine manante tenui in halitus dissipato, exsiccantur interdùm nimis oræ suppurantes, hinc carniùm ductilium ad cicatricem pullulatio ocyùs expectanda: Cùm autem non dissipatur humor, vel quòd ità tenuis non fuerit, vel quòd fervor tantus non extiterit, ne erumpant saniosæ carnes, ac inæquales, periculum sæpè aderit, quòd ipsæ potissimùm consent vasculis sanguineis neuro-lymphaticorum, utpotè sero acri consumptorum, consortio, tutela, fulcimento destitutis, hinc facilè lacerandis, cruore manantibus, nec æquali firmoque passu vegetantibus, quamobrem cicatrix ægrè ac mo-

lestè perageatur. Nec modò partibus ery-
sipelate affectis suppurationes molestæ sunt;
Sed & cum in tantâ, quæ in eis in-
terdùm fit, vasculorum prætermodùm
tensorum laniênâ ruptorum ad sana ra-
tio nimium evehitur, aut cum vasa, quæ
integra mansere, citiore fervido nimis
distenta sunt, aut in spasmum proritata,
nec ad ordinatas pulsiones valentia,
tunc succumbunt vires suppuratoria (Vid.
art. 3. 4. & 8. & Cor. 2. prop. 1.)
nec nisi mortificatio partis opperienda
est; eam autem defœdat priùs serum a-
liquod subflavum è lymphaticis laceris so-
lutum manans, hinc denegato exitu li-
bero aliquandò in vesiculis collectum, se-
cus in rivulos effluens, cumque serum id
tenuius & acre in halitus difflatum est,
sucedunt deinceps crustæ fuscæ, nigrican-
tes, atræ, vera Eschara, partem tunc
sideratam habeas, prunâ quasi exustam,
undè carbunculo affecta dicitur.

18°. In œdemate sanguis per vascula
minima lentè progreditur, crassus, torpi-
dus, feri plurimùm dimittens; exigui au-
tem ductus sanguinei eo nimis humentes
relaxati sunt, languidè pulsant, vascula
lymphatica admodùm turgent, fere per

sanguinea dispositè fluere impotente, per hæc reditum ad cor plenius quærente, partis textum stagnantibus aquis immersum est. Quare cum suppurationis casus (quod rarò fit) eveniet, languente efficiente ejus causâ, pus vix produceretur, manabit potiùs serum aliquod plus minus viscosum è ruptis lymphaticis velut è perenni fonte, hinc suppuratio tædiosa, (Vid. art. 6. prop. 1.) ulcus diù humidum, oras molles exhibens, quæ mortificatione levi de causa corripì poterunt, si nempe liquorum circuitus in eis tantillum ulterius moretur; aut etiam ex ductibus emollitis, flaccidis, carnes effingentur flaccidæ, molles, evanidæ, fungosæ, quarum ope nulla expectanda erit soluti continui unio, cicatrix nulla.

19°. In Scirrho parte tentatâ cruor tardigradus admodum est, meat tamen; tùm vascula ejus tarditati huic assuevere, pulsionumque segnitie ipsi accommodata sunt; lymphaticus pariter aut quivis parti peculiaris humor lentè fluit per vasa quædam, per aliqua, cum scirrhus perfectus est, nullatenus, in eisque exutâ penitus humoris formâ in margam concrevit; ab his autem concretionibus du-

ris aliquantum comprimuntur latera ductuum per quos fit aliquis adhuc sanguinis, lymphæ, & cujuscumque alius humoris partii proprii transitus, à quo pars umbrâ vitæ donatur; utque ductus hi jam ex liquoris contenti torpore ad pulsionem segnes sunt, ita & ab illatâ compressione illâ ad limites arctiores adducti, alveos constituunt exiguiore, per quos soliti fluenti portio arceatur, in vicinos ductus magis liberos quoscumque temporis lapsu derivata, adeò ut & hæc de causa vitalis principii in scirrho perfecto vix scintilla maneat. Non mirum ergò si tam debili in parte scirrho affectâ suppurationis causa efficiente, cum casus ejus excitabitur, hæc lentè adeò procedat, si liquamen vix sufficiatur aliquod, & quidem spissum, granulis autem duriusculis nonnunquam refertum, lymphatici humoris inspissati præprimis soboles, cui è ruptis quibusdam emortuis penitus ductibus suffecta fuere margæ lymphaticæ velut frustula quædam insolubilia, angulosa. Non mirum si scirrholosi ulceris oræ aridæ, aut parùm humentes deprehendantur; si compressa vascula indurata semperque infarcta extendi nescia sint,

si carnes non pullulent, si tamdiù & obstinatè adeò patula maneant hujusmodi ulcera, nullo fluido distendente molestata, indolentia, mutationi nulli velut obnoxia, vitâ quasi orba, nec tamen cadaveris ac saxi potiùs formam adeptâ. Non mirum si cum scirrhis ulceribus partes habitûs corporis quasque, quin & nobiliora viscera infestantibus, vita tamdiù protrahatur.

20°, Hic est in Cancro fluidorum ac vasculorum partis affectæ status, crassus est sanguis, plurimùm falluginosus, vasa minima ægrè permeans, ingurgitans, mole distendens, stimulis molestans, nec partim aliorùm derivatus partemque pacatam deserens, ut in scirrho legitimo contingit; lymphaticus autem humor aliusve indolis analogæ, ut est saliva, ut est lac, in vasculis hæret spissus, falluginosus, vascula stimulans, tendens, motum periodi in vasculis aliquibus at languidum adhuc servans, in plerisque absolutè stagnans, concretus, tophaceus, duritie vasis vicinis molestus, utpotè in quem velut in saxum asperum pulsionibus singulis impingunt vasa viventia valdè tensa, præcipuè autem sanguinea dilatata,

latata , semi - inflammata , hinc dolores
atroces procreantia. Cancrum dices scir-
rhum inflammatum , acriter dolentem.
Cum ruptis igitur in parte ita constitu-
ta vasculis nonnullis cancrum suppurari
eveniet , liquamina viscida suppeditabun-
tur ægrè manantia , è lymphâ crassâ , sal-
suginosâ , ab obstructis ductibus lentè e-
ductâ , potissimum confecta ; cancri por-
rò ulcerati oræ tumidæ erunt , inæqua-
les , duræ , vasculis potissimum constan-
tes neuro-lymphaticis magis minùsve in-
farctis , quin aliquibus penitus induratis ,
hinc inæqualiter sanè extensilibus. Insimul
liquamina purulenta è variis orarum hu-
jusmodi scrobibus lentè expurgata morâ
putrescent , foetorem concipient. At in-
super nonnulla rumpentur subindè sangui-
fera nimium diutiùsque compressa , in-
gurgitatave , tensa , quæque diù in par-
tes duras & asperas imegere , ab iisque
crur ater manabit , quo inficientur li-
quamina purulenta ; interdum si apertus
ductus sanguineus arteriola fuerit notabi-
liter dilatata hæmorrhagia gravis è can-
cro suscitabitur. Quin etiam vascula quæ
vis sanguinea & neuro-lymphatica ingur-
gitationem diutiùs passa , & à pulsanti

bus vicinis robustioribus continuè succul-
 fa, tandem lacerabuntur penitùs, contem-
 ptæ concretiones etsi tophaceæ ab am-
 bientibus effusis liquaminibus emollientur,
 orarumque induratarum portio fiet deinceps
 mollis, velut cadaver putrescens, hinc oræ
 hîc & illîc sensim excavabuntur, partes
 miserè sensim absumuntur in tabum hor-
 rendum conversæ, ex quibus cancer sævire
 ac serpere dicitur; nec desinet, quòd vasa
 libera compressiones & ingurgitationes
 lapsu temporis augendas è vicinis affectis
 continuè patiantur, liquores in eis spissitudinem
 novasque è morâ labes concipiant, undè cancri
 semper nova moles progeneretur, assiduò
 corrumpatur. His omnibus de causis fit,
 ut fluere è cancro conspiciantur purulenta
 liquamina spissa non solùm, & malè cocta,
 sed & foetentia, virentia, atra, saniosa,
 interdùm quasi è corrupto cadavere tabum,
 quod tamen viventi adhærere dolorum sævicia
 nimis perspicuè demonstrat. Hinc fit ut oræ
 semper serventur, & producantur duræ,
 inæquales, corrumpendæ, infarctûs semper
 ac putredinis caractere stipatæ, è quibus sanè
 expectanda nunquàm carniùm legitima-

rum germinatio , expectanda nunquam
erit cicatrix , quin potius assidua & con-
tinuata partis viventis absumptio aspectu
horrenda.

21.º Ut cancer scirrhus in suppuratione
ne sæviens habendus est , ita & alii dan-
tur tumores scirrhosæ mitisque à princi-
piis indolis , qui absque ullo fermè sen-
su ac fervore clam nullaque illatâ turba
in liquamina mollescunt viscida , lenta ;
quare tumores ejusmodi *Frigidorum* nomi-
ne insigniti fuerè ; tales habentur vulgò
Atheroma , *Steatoma* , *Meliceris* , *Lupia* ,
Natta , *Talpa* , *Ganglion* , *Batrachos* , *Serama* .
In ejusmodi autem tumoribus , vascula in-
farctâ non tam sanguinea sunt , quàm ;
& quidem longè maximâ parte , aut Lym-
phatica , præcipuè ubi in glandulas glo-
merata sunt , aut Adiposa , aut quæ Clop-
tonis Havers glandulas constituunt , aut
etiam exigua salivalia . Cùm ergò in tu-
moribus his vascula quæquæ disrumpen-
tur , rupta sanguinea pauca erunt , sana
pauca ingurgitata , pauca vibrantia , nec
nisi debile satis & clandestinum molimen
efficientia ; dùm aliundè cætera mox re-
censita vascula tum rupta cum integra
copiâ superiora abundè existent , viscidis

liquoribus crassisque plena, quæ quidem sanguineorum vires pulsivas plurimum eludent. Quibus de causis eveniet, ut non nisi lento gradu procedat è vasculis ruptis liquaminum expressio, & quidem viscosorum magis aut minus, subdulcium, pinguium, concretas moleculas admixtas gerentium; cumque insuper hæc immota & inclusa ferventur ac lentescant, pulsem modò, modò sevir, modò mel, modò gluten, sirupum modò æmulabuntur, & à pure tum formâ cum natalitiis discrepabunt, formâ, ut sensibus obvium est, natalitiis, quòd vix è cruore tanquam materiâ, originem duxerint, quòd in eis producendis cruoris vasculorum pulsiones vix concitatae fuerint.

Postquam autem liquaminibus hujusmodi pars fuerit expurgata, ne tamen carnicium legitimarum succrescentiam expectes, nî prius expulsum è sana parte fuerit involucrum aliquod plus aut minus consistens, quo prius velut in marsupio continebatur liquamen, *Cystis* appellatû, membranâ durâ interdum æmulans; quodque ut in pulve frigescente fit, progeneratis non constat pelliculis è crassiori liquaminis portione effictis, nec ductibus ullis aut sta-

minibus de novo productis, sed vasculis jam in parte existentibus ac liquoribus crassis infarctis, inertibus, ac velut induratis, ductibus ambientibus sanis continuis, hinc partem à sanâ continuâ organizatione discrepantem constituëntibus, ex quâ profectò vasculorum ad carnes efformandas eruptio suscitari nequit. Solutis autem vinculis cystis perfectè cum exciderit, è sanis partibus laceris pus fluet legitimum, tùm detersione peractâ, pululabunt carnes, succedet cicatrix.

22°. In gangræna vascula quamplurima mortem obiere; cum ergò in parte ità affectâ suppuratio deinceps suscitabitur, hæc in principio debiliter procedet (Vid. art. 3. prop. 1. & Cor. 2.) quousquè vel per escharam deciduam vel aliam ablationem, suppuratura pars vivens emortuæ subjecta, ipsive commixta sarcina hæc cadaverosâ liberata fuerit. Quod antequàm peragatur, liquamini purulento ab eâ emisso commiscebuntur semper micæ quædam cadaverosæ ipsi adherentes; quare pus primis diebus forde inquinatum manabit, foetidum, sensu na autem in dies expurgato tabo purius ac purius evasurum, ulcusque tandem cons

picietur consuetum, quo deterſo carnes ſuc-
creſcent, fiet cicatrix.

Haſtenùs de ſuppuratiõnis varietatibus
ex labe variâ ſolidorum & fluidorum in
parte ipſâ ſuppurante conceptâ, prout
caſus in apoſtematibus præcipuis potiſſi-
mùm occurrunt, dictum eſt. Ex iis ac
ex antedictis reliquæ in tumoribus, cæte-
ris ſuppuratiõni obnoxiiis notandæ varie-
tates, haud difficili operâ erui poterunt.

Sed &, prout partium continuitas di-
verſimodè ſoluta fuerit, ſuppuratiõ &
variè procedet. Quare.

23°. Cùm cæſim ſanciatae ſunt partes,
eruoſorem liberaliter effundere ſolent; id-
circò inaniuntur vaſa, nec inflammatio
ſuſcitatur ulla, aut vixdùm aliqua, de-
bilis aut etiam nulla adeſt cauſa ſuppu-
ratiõnis, parca aut nulla ipſius materies,
hinc non excitatâ ſuppuratiõne aut levi
ſaltem, citò carnes pullulant, ac modò
vulneris labra adducta ad ſe ſerventur,
citò fanè progeneratur cicatrix.

24°. Cùm vulnus punctim inſlictum
fuerit, inflammatio notabilis excitari ſolet,
& ità turgent interdùm huiusmodi vul-
nerum oræ, ut ſpecillo vix pateat aditus.
Quare hoc a quòd instrumenti acumine

sectis nonnullis duntaxat vasculis ac fibrillis, liquores parce effluxerint, à retractis interim in semet fibrillis resectis divellantur ita & quidem dolorificè connexa stamina integra circumquaque ambientia, ut per ea nimium tensa præpediatur liber humorum transitus, iique propterea cohibiti vulneris oras in tumorem ita elevent, ut apertura ejus firmè delcatur. In fauciatibus itaque punctim partibus acutè dolentibus & magnoperè inflammatis suppuratio diù suspensa manebit (Vid. art. 4. prop. 1.) nique efficax feratur auxilium, præprimis si vulnus penetrans sit, sanguisque effusus in parte fauciatibus lentescat, inflammatio summa, hinc suppuratio copiosa; aut, si succubuerint vascula, gangræna subsequetur.

25°. Cùm partes valdè attritæ sunt, ut in contusionibus magnis, vascula earum majori parte lacerata & confusa sunt, quocirca quæ integra relicta fuere vel oneri succumbent, undè mortificatio (Conf. art. 3. & Cor. 2. prop. 1.) vel si satis vegeta notabile adhuc quippiam pulsionibus moliantur, suppuratio suscitabitur abundans, quòd è ruptis tot vasculis magna sanè liquaminis moles excutiat.

Hinc ulceris deterfio tardè procedet , & interdùm carnes pullulabunt molles ac fungosæ , quòd vascula sana in suppuratione tali diù ac plurimùm laborarint , tùm & liquaminibus copiosè effusis emollita ab insito elatere remiserint , adeòque fluidorum contentorum impulsui nimis obsequentia ultrà limites requisitos citiùs , in granula nimirùm carnea rara propellantur , ex quibus tædiosè expectanda erit cicatrix.

26°. Cùm crematæ fuere partes molles , vascula exsiccata sunt , lacerata , & confusè cum liquorum extravasatorum cadavere commixta , nulla igitur in mole hâc inconcinnâ expectanda suppuratio (Vid. art. 3. prop. 1.) sub eâ autem & circumquaque vascula sana attingua compressa & molestata , nec liquores , ut priùs in partis jam deletos ductus effundere valentia , ingurgitantur , vehementiùs pulsant , in ruptis ductibus intermixtis suppurationem moliuntur , liquamina ab eis exprimunt , & quidem copiosa , quòd raptorum numerus magnus sit , quibus sanè liquaminibus expulsis escharæ vincula succutiuntur , eaque à sanâ parte dirimitur , undè prodit in lucem sana pars suppu-

rans; cujus quidem puri aliquamdiu escharæ putrescentis admixtæ sunt quædam reliquiæ, quibus sordescit ac foetet, quousque iis penitus expurgatis suppuratio laudabilis succedat, hinc deterfio, ac cicatrix. Sed si vascula sanæ partis, quæ sub escharâ delitescit, robusta non extiterint, aut si ab escharâ nimix molis nimum fuerint oppressa, oneri succumbunt, ingurgitantur ultramodum, undè gangræna, aut saltem suppuratio languida latens, deterfio difficilis. Postremò in ambustis molestas suboriri suppurationes fervore insigni stipatas eveniet, cum vasa integra robur aliquod cum siccitate tamen notabili ab ignito corpore impressâ servarint (Vid. art. 7. prop. 1.

27°. In adustis gelu, vascula aut rupta sunt, aut liquoribus concrevis turgida, vitali motu penitus orba; ad crepaturam propè adducta; quies mortifera has partes occupat, in his ergò nulla suscitabitur suppuratio, indèque aut exsiccatæ in crustam abibunt, vel, quod frequentius fit, liventes in putrilaginem liquabuntur gangrænosam, quâ plurimum gravabuntur, plurimum emollientur partes sanæ ambientes, in quibus profectò liquorum tran-

situs haud parùm retardabitur cum caractere lentoris eis iniusto ; undè aut gangræna ulterior, aut saltem suppuratio languens, ac velut suffocata, deterfio deindè difficilis, carniùm molliùm ac evanidarum eruptio, tædiosa cicatricis progeneratio.

28°. Cùm corrosivis partes divisæ fuerent, magnam profectò vasculorum laniationem pallæ sunt, quapropter si hæc penitior sit, pars in escharam aut in putrilaginem, si humidior illa, abibit, tùm succedent, quæ in art. proximè antecedenti notavimus. Si verò laniena tanta non extiterit, vasculaque integra, inter laniata, iisve proximè subjecta, à corrosivi incurfu incolumia satis servata fuerint, satisque vividè pulsent, suppuratio uber è laniatis tot vasculis liquamina purulenta copiosè profundentibus excitabitur. Pus profluet escharæ aut putrilaginis frustulis infectum, hinc succedent ea, quæ in art. 22°. notavimus.

29°. Pars suppurans cùm undique aperta est, quâ proportione è ruptis canaliculis expuuntur liquamina, iis penitùs liberari potest, hinc deterfio facilis, nullumque in pullulatione carniùm ac cicac-

trici efformatione ab stagnatione puris impedimentum.

30°. Cùm cæca fit suppuratio, abscessusque produciuntur, è ruptis ductibus manantia liquamina foràs ejici non possunt, in substantiâ autem partis colliguntur; vi siquidem causæ suppurationis expressivâ hæc sensim in staminum intercapedines insinuantur, stamina iis sensim divelluntur: eòque faciliùs, quò ruptis partim in suppurante parte ipsâmet vasculis, vincula, quibus simul connectebantur, plurimùm soluta sunt; moles ergò puris spatium occupat ità comparatum, ac partem dilatât; hinc, suppuratio postquàm peracta est, sedataque fuere prodromi ejus vehementia symptomata, lacus puris undiquè conclusus; pars è durâ, tensâ, inflammâtâ, vexatâ, facta mollis, pacata. Jàm verò puri aut citò paratur exitus, aut nequaquàm. Sic autem ipsi viæ liberæ aperiuntur, aut arte, aut naturæ viribus, arte quidem, sectione nimitùm aut corrosione, naturæ viribus, cùm stamina diducta & ad basim abscessûs densiora vi contractili puris molem premunt, eamque in partem ambientem tenuiorem ac minori vi se contrahendi pollentem adi-

gunt, undè hæc in acumen elevatur, sensimque ad crepaturam ducitur. Cùm autem puri sæpèque etiam evasato commixtoque cruori, ex abscessûs cavitate liber exitus paratus est, deterfio tunc peragitur, insità vi in se contrahuntur cavittatis parietes, carnes pullulant, fit cicatrix. Sed cùm facto abscessu nec arte puri via paratur, nec vi naturæ id foràs ejicitur, parti sanè molestiæ accedunt; præterquàm enim quòd diducta tensaque tali mole servantur ejus stamina, undè fluidorum transitus præpeditur, pus etiam stagnando qualitates adipiscitur nocivas, acre nam fit, partique laceræ applicatum, eam vellicat, stimulat, undè fluidorum in ductibus sanis cohibitiones. His ergò de causis inflammationis turbæ, quæ jam pacatæ fuerant, iterum recrudescent, instauratur suppuratio parti jam afflictatæ plurimùm sanè gravis, quâ hæc detrimentum ulterius patitur, absimiturque. Prætereà cùm puri collecto liber non patet exitus, hoc in partium quarumcumque præcipuè in musculorum intercapedines viam sibi sæpè terit, latè diffunditur. Quâ vi? Eâdem, quâ rumpi abscessum in parte debiliori diximus; vi staminum expressivâ, ad partes

quæ minùs resistunt , puris molem adigente , ut cum pasta manu clausâ premittur , hæc per digitorum intercapedines erumpit. Hoc mechanismo sinuum plerorumque productiones , abscessuum crepaturas , quin ad puris vim corrosivam , vim sæpè ab eo absentem , semper confugas , facillimè explicabis.

31°. Cùm *Vomica* abscessus sit cystide præditus , quæ circa puris collectionem in substantiâ partis ad abscessûs simplicis productionem jamjâm allata sunt , ea huc transferantur. Undenam verò cystis hæc vomicarum? Hanc non pelliculam putes ex inspissato pure , at neuro-lymphaticorum extrema fluidis crassis infarcta , aliquantùm indurata , abscessûsque parietes à substantiâ partis ob consistentiam diversam distinctos , quibus puris moles undique involvatur , efficientia (Conf. art. 21.) Hinc fit ut vomicarum pus ità septum quaquaversùm haud diffundatur , nec nisi ruptâ cystide educi queat. Cùm autem eductum fuerit , nè tamen deterfam partem habeas , & ad cicatricem habilem; textum enim neuro-lymphaticorum extremorum obstructorum & induratorum , quibus cystidem constare diximus , in car-

nes extendi nequit, quamobrem à vasis cæteris benè constitutis ac vividè pulsantibus, tum ab staminibus contractis velut crusta iners nec puris mole ampliùs fulcita, succutitur, expellitur, solvitur sic ejiciturque in frustula cystis; quò tandem è vasculis vegetis ità liberatis post levem ac laudabilem suppurationem carnes debitè pullulent, parsque ferramine-
tur.

32°. Cùm ulcus sinuosum est, quâ proportionè pus è ruptis ductibus exprimitur, eâ tamen sæpenumerò penitus foràs non ejicitur; vel quòd foramen sinûs emissarium arctius sit, vel quòd in declivi non positum. Sequuntur ergò, quæ impeditæ puris abscessuum expurgationi supervenire diximus, posteriores nimirum suppurationes ac sinuum progenerationes novæ; qui sanè effectus ægro & curanti molestiæ plurimùm afferunt; hi tamen paulò lentius ac in abscessibus succedere solent, quòd in sinibus semper sit aliquis puri exitus; undè parti suppuranti tanta non procreatur noxa, ac dùm pus nullam omninò reperit viam, quâ exeat. Prætereâ cùm sinûs cavitas pure satis purgari non potest, idque diutiùs retinetur, superfi-

ciei ejus applicatum , nec vasculorum pullulantium viribus amplius succussum , stagnando inspissatur , orificia partis suppurantis emissaria sensim obturat ; quare liquamina in ductibus ruptis paulatim retinentur , lentorem concipiunt , sicque sensim infarcitur , ac premitur neuro-lymphaticorum textus ad ulceris sinuosi superficiem pertingens , induratur , ab eo liquamina vix effluunt , quibus specûs suppurantis superficies humescat , fit *Fistula* , quâ subsistente nullam expectes carnum debitam pullulationem (parietes enim callosi extendi nescii sunt) multò minùs cicatricem.

Supersunt postremò errores artificum perpendendi , quibus suppurationes variè procedunt , ac in pejus ruunt , errores numerosiores profectò , quàm ut in specimine hoc ad amissim enucleari debeant , quique in suppurationum Therapeia , quò declinentur , potiùs recensendi. Horum nonnullorum tamen jam antea meminimus , quibus inhiberetur suppuratorium opus , ac interturbaretur. In articulo 1°. siquidem prop. 1. quâ resolventia intempestivè adhibita suppurationi impedimento essent ; in 4°. 7°. ac 8°. cur Topica ca-

lidiora, ut Vesicantia, Caustica, Acria, Spirituosa, similiaque suppurationem præpedirent, cohiberent; in art. 9. cur supprimeretur, aut fieret languida suppuratio ex apparatu chirurgico partes suppurantes nimium comprimente; in art 10°. quamobrem Repercussiva, venena quædam, ær frigidus suppurationes sisterent, indicatum est. In his nimirum articulis prævos partes suppurantes curandi modos attulimus, qui suppurationibus obstarent. Aliquos nunc duntaxat, at summè notatu dignos, & in praxi quotidianâ nimis observabiles, suppuratorium opus, præcipuè quoad deterfionem carniûmque pululationem, plurimum immutantes, eique adversos, perpendere interest.

33°. Partem suppurantem servare mundam, cum non curatur, liquamina purulenta superficiei diutiùs adhærent immota, spissitudinem concipientia, eaque vel sola, vel etiam sæpenumerò admotorum medicaminum sedimento ac squalori commixta; ab hâc ergò spurcitiæ vasorum ruptorum orificia obturantur, undè liquaminum in eis cohibitiones, ex iisque aut indurationes paulatim enatæ, quas ulceris orarum *Callositates* appellant, vel inflammationes

flammationes subito productæ parti jam pacatæ plurimum graves, quibus aut arefcit ulcus; aut suppuratio ulterior ac immanis promovetur. (Conf. art. 15.)

34°. Ut autem ulcera curantis culpâ immunda & conspurcata manent, quòd nimirum aut non detergantur sæt frequenter, in iisque curandis Chirurgus comperendinet, vel quòd unguenta aliave topica singulis vicibus, quibus tractatur ulcus, non mutantur, vel quòd Ceratis aut Emplastris ulceris superficies graveatur, ab iisque immediatè applicatis puris imbibitio & ablatio præpediatur; ità & mundities aliquibus adeò arridet, ut ei acrius patrociantes, suppuratorium opus in pejus mutant, infensique potius parti suppuranti, quàm opitulatores habendi sint. Lavant hi nimirum continuò ulcera aquis mineralibus, vino, decoctis medicatis, linteis carptis ea continuò detergant, alii suspensâ manu, gravi alii, quò, ut aiunt, ulceris superficiem ad amussim mundent. Quid autem hâc moliantur methodo? Iteratis lotionibus pus non modò abluunt, sed & vascula superficiiei ulceris tenera emolliunt, sic suppurationis causam hebetant, ac liquaminum è vasis rup-

tis purgationem debitam impediunt, suspendunt; tùm relaxando nimum his loturis partis textum, carnes deinceps procurant molles, spongiosas, fastidiosas. Deteriores verò ulcerum nimii superficiem eorum ità fricando, pus imbibunt quidem, ac auferunt, ac vasculorum extremorum humorem etiam imbibunt, & auferunt, sine quo ductilitas nulla in eis ad pulsiones deterfionis effectrices requisita, sine quo extensilitas nulla ad carnes excitandas. Qui autem linteis asperis manuve gravi & rusticâ ulcera fricant, pus eripiendo, carnes teneras pullulantes simul abradunt, vascula vegetantia miserè daniant, ulcus cruentant, materiem molliculam; quæ ulceris superficiem obducit, pus existimantes, hanc autem vascula esse tenera inscîi; sic ergò ulcera miserè dilacerant partis suppurantis tortores seduli. Carnium embryones reparatrix natura iterùm promit, ipsi eos abradunt ac suffocant. Abruptis itaque frequenter ad eò & obstinatè vasculis teneris, succussisque aliis ac è loco dimotis, fit tandem vasculorum confusio, lymphæ cruorque per vasa ægrè moventur, in iisque emollicis, flaccidis, semi-atritis abundè congeruntur,

ſæpe efflorefcere citò deinceps conſpiciuntur carnes, ſed tumidæ, ſemi-laceraæ, fluidis ſedimentofis onuſtæ, ſordidæ; ex deterſionibus nimis non mundari ulcus æſordeſcere magis diceres. Si autem compreſſis validiùs, vehementerque attritis exiguis neuro lymphaticis, ulteriùs lymphæ lentefcat, inſpiſſatur, partis textum indureſcit, hinc oræ ulceris calloſæ. Quotidianus labor tegumentis partes munitas indurat, deterſio pariter frequens aut validior teneras ulceris carnes efficit calloſas.

35°. Partes ſuppurantes cùm frequenter curantur, aëri & frequenter exponuntur; à quo non ex ſalibus ullis, ſed à temperie diverſâ duntaxat noxam patiuntur (Conf. art. 10. prop. 1.) ut ut enim igne propè curandam partem admoto intemperiei ejus cavere nitantur, hæc tamen incolumis ita ſervari nequit, ut naturalis tepor aliquantum non infringatur, muteſturve, ut ſaltem halitus tenues, qui fluxilitatem in parte ſuppurante tuentur, in auras non avolent; ex quâ quidem alteratione in parte ſuppurante ſuſceptâ retardatis in ductibus tum integris cùm ruptis aliquomodò humorum fluentis, ſuppuratorium opus haud parvi faciendam patitur noxam, diutiùsque protrahitur.

ERRATA.

P Ag. 2. lin. 2. leg. observare. Pag.
19. lin. 8. & pag. 33. lin. 10. leg.
molliculæ. Pag. 35. lin. 21. leg. molli-
cula. Pag. 42. lin. 3. leg. æstuans. Pag.
46. lin. 5. leg. languente. Pag. 54. lin.
13. leg. variè procedet. Quare Pag. 58.
lin. 14. leg. antecedenti.